




موقع مدرستي التعليمي

حل بوكليت الاحياء التجريبي
للسانوية الازهرية pdf 2026

www.myschool77.com 

المصدر الرسمي للموارد التعليمية والأنشطة المدرسية

حقوق الطبع محفوظة © موقع مدرستي التعليمي



نموذج ثانوية أزهريّة تجريبي

الصفحة ١ من ١٦

الأزهر الشريف
قطاع المعاهد الأزهرية
الإدارة المركزية للامتحانات
وشئون الطلاب و الخريجين

الورقة الامتحانية
لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية - نموذج تجريبي
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

المادة/الأحياء (تجريبي)	
القسم العلمي	زمن الإجابة: ثلاث ساعات

السؤال	الدرجة بالأرقام	اسم المصحح ثلاثيًا
الأول		
الثاني		
الثالث		
الرابع		
الخامس		
المجموع		

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

الرقم السري

مجموع الدرجات (مكتوباً بالحروف):

اسم المراجع العددي ثلاثيًا: اسم المراجع الفني ثلاثيًا:

الأزهر الشريف - قطاع المعاهد الأزهرية - الإدارة المركزية للامتحانات وشئون الطلاب و الخريجين

نموذج ثانوية أزهريّة تجريبي

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية - تجريبي

للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

المادة/الأحياء (تجريبي)

الرقم السري

اسم الطالب كاملاً:

اسم المعهد:

رقم الجلوس:

التاريخ: / /

٢-

توقيع الملاحظين بالاسم: ١-

تنبيه: على الطالب كتابة اسمه ولقبه كاملاً، ويحظر عليه كتابة أي علامة تدل عليه داخل ورقة الإجابة.

أجب عن الأسئلة التالية: (١٢ درجة لكل سؤال)

[السؤال الأول]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- هي مجموعة الهرمونات المسئولة عن نمو البروستاتا والحوصلات المنوية في الذكر.

- (أ) الإندروجينات (ب) الإستروجينات
(ج) TSH (د) ACTH

٢- أي الكائنات الحية التالية يتكاثر بالتجدد ؟

- (أ) الجمبري (ب) الضفدعة
(ج) السلمندر (د) الأسفنج

٣- المفاصل التي توجد بين أجسام الفقرات العظمية في الإنسان هي مفاصل

- (أ) ليفية (ب) زلالية محدودة
(ج) زلالية واسعة (د) غضروفية

٤- المادة التي تحفز نضج الخلايا الليمفاوية الجذعية إلى الخلايا التائية هي

- (أ) الكيموكينات (ب) الإنترليوكينات
(ج) التيموسين (د) الإنترفيرونات

٥- لتكوين بروتين من 300 حمض أميني فإن عدد لفات جزيء DNA الذي سيتم نسخه

لتكوين البروتين هو لفة.

- (أ) 15 (ب) 30
(ج) 45 (د) 90

٦- الجزيء المسئول عن قراءة لغتي الأحماض الأمينية والنيوكليوتيدات هو

- (أ) بلمرة RNA (ب) tRNA
(ج) mRNA (د) DNA

لغة ٩٥ → ١٠ ز. و
٩٥ و

(ب) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

١- الإنزيم الذي يقوم ببناء DNA على قالب RNA .

(**إنزيم (النسخ العكسي)**)

٢- نظام دفاعي داخلي يعتمد على طرق وعمليات غير متخصصة تحيط بالميكروبات لمنع انتشارها.

(**خط الدفاع الثاني**)

٣- نسيج غذائي يحيط بالكيس الجنيني داخل مبيض الزهرة.

(**النوسجيد**)

(ج) علل لما يلي:

١- يلجأ الأسبيروجيرا أحياناً إلى الاقتران. في الظروف الغير مناسبة
يلجأ إلى التكاثر جنين بالاقتران الباني في أواخر


٢- حدوث إجهاد للعضلة الهيكلية. عند نقصه O الرامل للعضلة
تلباً العضلة للتنفس العلوي اللاهوائي الذي ينتج عنه حمض
اللاكتيك الذي يجب إجهادها
٣- يتم فقد 5000 قاعدة بيورينية من الخلية البشرية في اليوم الواحد.

بسبب مرارة لبس ربيبة المائي له الحرارة تكسر
الرداب الساهبه التي تربط الريا
الفاسيه

الشهادة الثانوية الأزهرية (١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م) الأحياء - القسم العلمي - البوكليت التجريبي (الصفحة ٨ من ١٦)

(ب) (١) ادرس الشكل المقابل والذي يوضح شكلاً تخطيطياً لبويضة قبل

الإخصاب مباشرة، ثم أكمل الجدول.



الدالة	رقم التركيب	اسم التركيب
المشيح المؤنث	١	خلية (كبيضة)
يكون الإندوسبرم	٤	نواة كيسة جنين
تدخل من خلاله أنبوبة حبة اللقاح	٣	النقير
يصل البويضة بجدار المبيض	٢	جل سري

(٢) ماذا يحدث عندما تنتقل محتويات أنبوبة اللقاح إلى داخل التركيب (٥) بعد ث الأخصاب المزدوج

١. اندماج نواة ذكرية (٤) مع خلية البسيف (٥) → الزيجوت (٢٣)

٢. اندماج نواة ذكرية (٤) مع نواة كيسة جنين (٤) → نواة (٢٣) (لا نذكر)
" اندماج الثلاثي "

(ج) اذكر ما تدل عليه العبارات التالية:

١- صورة التكاثر اللاجنسي في نبات الطباق. (مراعاة الأربعة)

٢- حالة وراثية في الانسان يكون عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية ٤٥ كروموسوم.

(حالة انتش ٤٤ + x)

٣- هرمون يعمل على انقباض الحويصلة الصفراوية. (هرمون كولستولمينين)

[السؤال الثالث]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- تتصل الغدة بمنطقة الهيبوثالامس.

- (أ) التيموسية (ب) الدرقية
(ج) النخامية (د) جار الدرقية

٢- عدد مجموعات الفوسفات الحرة في البلازميد... لأنه جزئ داوي ملقم نزياته

- (أ) 3 (ب) 2
(ج) 1 (د) 0

٣- الريزومة تتواجد في

- (أ) النبات المشيجي للفوجير (ب) عفن الخبز
(ج) نبات الفول (د) النبات الجرثومي في الفوجير

٤- يصعب على الخلايا المناعية التعرف على مريض... لأنه يدرسه الميزر HIV

- (أ) الانفلونزا (ب) الكورونا
(ج) الإيدز (د) الجدري

٥- عدد الأربطة المتواجدة عند اتصال عظمة الفخذ بعظمة القصبة... خلايا بلعبي كبيرة

- (أ) 1 (ب) 2
(ج) 3 (د) 4

رباط جانبي + رباط صليبي + رباط جانبي خلفي

٦- في الحيوان المنوي يوجد السنتريلولان والأكروسوم على الترتيب بمنطقتي

- (أ) الرأس / العنق (ب) العنق / الرأس
(ج) القطعة الوسطي / الرأس (د) الرأس / القطعة الوسطي



عنق + سنتريلولان

[السؤال الرابع]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- لا تستطيع الخلايا TH التعرف على الأنتيجينات إلا بعد ارتباطها بـ

(أ) Ig (ب) MHC

(ج) CD8 (د) ACTH

٢- يتكون الحمض النووي RNA من وحدات بنائية تسمى

(أ) الجينات (ب) النيوكليوتيدات

(ج) الريبونوكليوتيدات (د) أ، ج معاً

٣- أي مما يلي لا يعتبر من مكونات حبوب اللقاح فور انتشارها من الملتك؟

(أ) النواة الأنبوبية (ب) أنبوبة اللقاح

(ج) النواة المولدة (د) الجدار السميك

٤- الطفرة في فطر البنسيليوم

(أ) تلقائية نافعة (ب) تلقائية ضارة

(ج) مستحدثة نافعة (د) مستحدثة ضارة

٥- إذا كان عدد الصبغيات في نواة خلية نبات البسلة 7 أزواج فإن عدد الصبغيات في النواة

(أ) الأنبوبية

(أ) 7 صبغيات (ب) 7 أزواج

(ج) 21 صبغي (د) 14 زوج

٦- عضلة القلب قلب مضطرب لا إرادي

(أ) إرادية مخططة (ب) إرادية غير مخططة

(ج) لا إرادية مخططة (د) لا إرادية غير مخططة


نكون بعد سقوط حبة
المقاح على ميسم الزهرة

$2n = 14$ أزواج
 $n = 7$ صبغيات تنضج

(ب) تخير من العمود (ب) والعمود (ج) ما يناسب العمود (أ) لتكون عبارة صحيحة ثم اكتبها كاملة حسب ترقيمها.

م	(أ) المادة	(ب) نوع الخلايا	(ج) الأهمية
١	الهستامين	أ- TC النشطة	a - تنشيط الخلايا الليمفاوية.
٢	البيرفورين	ب- TS النشطة	b - تثبط نشاط الخلايا الليمفاوية.
٣	الليمفوكينات	ج- الصارية	c - تقضي على الخلايا السرطانية.
٤	السيتوكينات	د- TH النشطة	d - تمنع انتشار الفيروس بالخلايا السليمة.
٥	الإنترفيرونات	هـ- الخلايا السرطانية	e - تزيد من نفاذية الشعيرات الدموية لسوائل الدم.

- ١- هستامين ← صارية ← تزيد نفاذية الشعيرات الدموية...
 - ٢- بيرفورين ← TC ← يقضي على خلايا سرطانية
 - ٣- الليمفوكينات ← TS ← تثبط نشاط الخلايا الليمفاوية
 - ٤- السيتوكينات ← TH ← تنشيط خلايا لليمفاوية
 - ٥- الإنترفيرونات ← خلايا صارية بالفيروس ← تمنع انتشار الفيروس بالخلايا السليمة
- (ج) وضح بالرسم دور الإنزيمات في تضاعف DNA.



(ب) ادرس الشكل المقابل والذي يمثل إحدى خطوات تخليق البروتين ثم أجب عما يلي:



١- المرحلة التي يدل عليها الشكل:

(أ) بدء التخليق (ب) استطالة السلسلة

(ج) توقف بناء البروتين (د) بناء mRNA

٢- استخرج الأخطاء الموجودة بالشكل ثم اكتبها صحيحة.

خطا 3 موقعي يستبدل رأينوايل



محددون
بدء عند طرف 5'

الخطأ (١) ... كودون البدء عند الطرف 3'

الصواب ... كودون البدء عند الطرف 5'

الخطأ (٢) ... الترميز في اتجاهين

الصواب ... الترميز في اتجاه واحد فقط

3' → 5'

٣- حدد التركيب الوظيفي للعضى بالشكل:

(أ) ... وحدة الريبوسوم كبرى على موقعي A و P

(ب) ... وحدة الريبوسوم صغرى التي ترتبط بـ mRNA

(ج) قم بتصحيح العبارات التالية دون تغيير ما تحته خط:
في بدء عملية تخليق البروتين

١- عضو التأنيث في دورة حياة الفوجير الأنثريديا. عضو (التذكير في دورة حياة الفوجير)

٢- عدد عظام الحزام الصدري المتصلة بعظمة القص ٢٠. عدد متنوع المقصود (الصدري)

هرمون الجلوكاجون المستعمل في بعض النقص

٣- هرمون الأنسولين يفرز من خلايا ألفا بجزر لانجرهانز.

٤- موقع ارتباط الريبوسوم بجزء mRNA هو CCA. موقع اندراجها بالمحفز

البروتين هو mRNA هو CCA

[السؤال الثاني]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- تم استنساخ النعجة دولي من.....

- (أ) نواة اللاقحة (ب) بويضات الأم
(ج) خلايا ثدي الأم (د) خلايا جنينية

٢- عدد أنواع الخلايا في الأنسجة المنوية

← يحتل إجابتين عدد أنواع الخلايا الرئيسية : سرتولة + الجرثومة
عدد أنواع جميع المراحل ٦

- (أ) 2 (ب) 4
(ج) 6 (د) 8

٣- لا تعمل المتحسسات إلا في وجود الخلايا..... شرط محاسن ارتباط الجسم

- (أ) T_C (ب) T_S
(ج) T_H (د) B

B

T_H

٤- تحدث سرعة الانفعال والغضب في الإنسان بسبب.....

- (أ) نقص هرمون الأدرينالين (ب) زيادة هرمون الباراثورمون
(ج) نقص هرمون الباراثورمون (د) زيادة هرمون الثيروكسين

جيب عصب

٥- في قطعة mRNA المنسوخ من جزء لأحد أشرطة DNA كالتالي.

3' UAG GCU CCA CCA GCU 5' يكون عدد أنواع tRNA

- (أ) 6 (ب) 5
(ج) 4 (د) 3

٦- يحيط النبات نفسه بطبقة من خلايا غير منفذة للماء مرسب فيها مادة

- (أ) الكيوتين (ب) السليلوز
(ج) اللجنين (د) السيوبرين